

Size : 185 x 80 mm

(2 color, 65 gsm offset)

Suspension

## Bloatnil Vet

Simethicone & Dill Oil

Only for the use of animals

### Composition

Each 100 ml suspension contains Simethicone USP 1 g & Dill Oil BP 0.5 ml as an excipient.

### Pharmacology

**Simethicone:** Simethicone is an anti-foaming agent that disintegrate gas bubbles and allow easy passages of gas.

**Dill oil:** Dill oil has carminative properties. It helps stopping gas formation in the rumen.

### Indications

For the treatment of all kinds of Bloat & Tympany of cattle, buffalo, sheep and goat.

### Dosage & Administration

#### Acute Disease:

Cattle/Bufaloes: 100 ml 2 times daily

Sheep/Goat: 20 ml 2 times daily

#### Chronic Disease:

Cattle/Bufaloes: 50 ml 2 times daily

Sheep/Goat: 10 ml 2 times daily

Administer orally as drench or intraruminally by using cannula or a long needle.

Or as directed by the registered veterinary physician.

### Contraindication

Contraindicated to animals hypersensitive to Simethicone or any other components of the product.

### Warnings & precautions

Sometimes, the obstruction of esophagus may cause bloat. In such cases, treatment should be given by registered Veterinary Physician.

### Side effects

**Common:** Simethicone is physiologically inert and no adverse effect has been noted after oral administration.

**Rare:** Not known.

### Use in Pregnancy & Lactation

The Safety of Simethicone for use in pregnant and lactating animals has not been established.

### Drug interactions

**With Medicine:** There is no evidence that Simethicone modifies the effect of other drugs.

**With food and others:** Not known

### Overdose

Data regarding overdoses with simethicone are rare due to the fact that it is not systemically absorbed.

### Withdrawal periods

Meat & Milk: 0 (Zero) day.

### Storage

Store below 30°C temperature, protected from light and in a dry place. Keep all medicines out of reach of children.

### Packing

100 ml & 500 ml bottle.

Manufactured by:  
**Navana Pharmaceuticals Ltd.**  
Rupshi, Rupganj, Narayanganj, Bangladesh  
NCLT0624\_07-23\_01

 **NAVANA PHARMA**   
Veterinary Division

সাসপেনশন

## ব্লটনিল ভেট

সিমেথিকন এবং ডিল ওয়েল

শুধুমাত্র প্রাণি চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য

### উপাদান

প্রতি ১০০ মি.লি. সাসপেনশনে রয়েছে, সিমেথিকন ইউএসপি ১ গ্রাম এবং এল্লিপিয়েট হিসাবে ডিল অয়েল বিপি ০.৫ মি.লি.।

### ফার্মাকোলজি

**সিমেথিকন:** সিমেথিকন একটি অ্যান্টি-ফোমিং এজেন্ট যা গ্যাসের বুদবুদগুলিকে ভেঙ্গে সহজে গ্যাস বের করে দেয়।

**ডিল অয়েল:** কার্মিনেটিভ বৈশিষ্ট্য আছে যা রুমেনে গ্যাস বন্ধ করতে সহায়তা করে।

### নির্দেশনা

গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার সকল ধরনের ব্লট (ফেনাযুক্ত) এবং টিম্প্যানি (ফেনাবিহীন) এর চিকিৎসায় নির্দেশিত।

### প্রয়োগমাত্রা ও প্রয়োগবিধি

#### তীব্র রোগের ক্ষেত্রে-

গরু ও মহিষ: ১০০ মি.লি. করে ২ বার

ছাগল ও ভেড়া: ২০ মি.লি. করে ২ বার

#### দীর্ঘমেয়াদী রোগের ক্ষেত্রে-

গরু ও মহিষ: ৫০ মি.লি. করে ২ বার

ছাগল ও ভেড়া: ২০ মি.লি. করে ২ বার

সরাসরি মুখের ভেতর অথবা ক্যানুলা বা লম্বা সুটের মাধ্যমে রুমেনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে।

অথবা রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শে ব্যবহার্য।

### প্রতিনির্দেশনা

সিমেথিকন অথবা ওষুধটির অন্য উপাদানের প্রতি সংবেদনশীল প্রাণীদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

### সাবধানতা ও সতর্কতা

খাদ্যনালীতে প্রতিবন্ধকতার কারণে কিছু ক্ষেত্রে ব্লট/টিম্প্যানি দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে, রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি চিকিৎসকের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করতে হবে।

### পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

**সাধারণ:** সিমেথিকন শারীরবৃত্তীয়ভাবে নিষ্ক্রিয় এবং মুখে খাওয়ার পরে কোনও বিরূপ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় নি।

**বিরল:** জানা নেই

### গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী প্রাণিতে ব্যবহার

গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী প্রাণিতে সিমেথিকনের ব্যবহার নিরাপত্তা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

### অন্যান্য ঔষধের সাথে প্রতিক্রিয়া

**ঔষধের সাথে:** সিমেথিকন অন্যান্য ঔষুধের প্রভাবকে পরিবর্তন করে এমন কোনো প্রমাণ নেই।

**খাবার এবং অন্যান্যের সাথে:** জানা নেই।

### মাত্রাতিরিক্ত

সিমেথিকন দেহে পরিশোষিত হয় না তাই মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে কোনও বিরূপ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়নি।

### প্রত্যাহার কাল

মাংস ও দুধ: ০ (শূন্য) দিন।

### সংরক্ষণ

৩০°C-এ তাপমাত্রার নিচে, আলো থেকে দূরে ও শুষ্ক স্থানে রাখুন। সকল ঔষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

### সরবরাহ

১০০ মি.লি. ও ৫০০ মি.লি. বোতল।

### প্রস্তুতকারক:

**নাবানা ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড**

রূপশী, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ

 **নাবানা ফার্মা**   
ভেটেরিনারি ডিভিশন